

Система защиты сливы (алычи) против вредителей и болезней сливы

Вредитель, болезнь	Срок проведения обработки	Условия и способы проведения защитных мероприятий	Препарат, норма расхода (кг/га, л/га)
Монилиоз, кластероспориоз, зимующие стадии вредителей	Зимний и ранневесенний период (до распускания почек)	Обрезка и уничтожение засохших, пораженных вредителями и болезнями ветвей, очистка старой отмершей коры на штамбах и скелетных ветвях, снятие и сжигание гнезд вредителей и мумифицированных плодов	
Зимующие стадии вредителей	Ранневесенний период до распускания почек	Опрыскивание до распускания почек при температуре воздуха не выше 20° и не ниже 4° С	азофос, 65% пс (10 кг/га)
Монилиоз, дырчатая пятнистость, плодовая гниль	Весной, до распускания или в начале распускания почек	Профилактическое опрыскивание деревьев	
Сливовая тля, листогрызущие чешуекрылые, кластероспориоз	Фенофаза выдвижения бутонов.	Опрыскивание деревьев при численности вредителей выше пороговой и при наличии инфекции заболевания	Инсектициды: БИ – 58, 400 г/л к.э. (1,2-2 л/га); золон, 35% к.э.(0,8-2,8 л/га); фуфанон 570 г/л к.э. (1 л/га); Фунгициды: топсин М, 70% с.п. (2 кг/га); байлетон, 25% с.п. (0,12-0,2 кг/га).
Сливовые плодовые пилильщики (желтый и черный), монилиоз и др. пятнистости	Перед цветением	При отряхивании с дерева более 10 особей пилильщика и при наличии заболеваний опрыскивание деревьев	Инсектициды: БИ -58, 400 г/л к.э. (1,2-2 л/га); фуфанон 570 г/л к.э. (1л/га); Фунгициды: байлетон, 25% с.п. (0,12-0,2 кг/га); топсин-М, 70% с.п. (2 кг/га)
Плодовые клещи	Перед цветением	При численности выше пороговой	Инсектициды: данадим 400 г/л к.э. (1,2-2 л/га);
Плодовые и листовые пилильщики тли, кластероспориоз	Через 2-3 дня после цветения	При повреждении плодов желтым сливовым пилильщиком 3-4 % и при появлении признаков заболеваний опрыскивание деревьев	Инстициды: БИ-58, 400 г/л к.э. (1,2-2 л/га); золон, 35% к.э (0,8-2,8 л/га); Фунгициды: топсин М, 70 % с.п (2 кг/га); байлетон, 25% с.п. (0,12-0,2 кг/га)
Сливовые плодожорки, листовые пилильщики	Рост плодов	В начале отражения гусениц сливовой плодожорки при поврежденности плодов выше 2-3% - опрыскивание деревьев	золон, 35% к.э. (0,8-2,8 л/га); фуфанон 570 г/л к.э. (1л/га);
Кластероспориоз	После уборки	Опрыскивание деревьев	Фунгициды: топсин М, 70% с.п.(2 кг/га);